

## Legionella-MWY-Agar (MWY NEN)

<b>Shorthand symbol:</b>	MWY NEN
<b>Item number:</b>	56-1604
<b>Format:</b>	Platte, 90mm
<b>Colour:</b>	Schwarz, fast undurchsichtig
<b>Storage conditions:</b>	Trocken, verschlossen, bei 4-25°C
<b>Shelf-life:</b>	3 Monate
<b>pH:</b>	6,80 ± 0,20



### Intended use and fields of application

Legionella-MWY-Agar ist eine Alternative zum GVPC-Agar für die Anzuchtung von Legionellen. Durch zusätzliche Hemmstoffe verfügt der MWY über eine bessere Selektivität und erleichtert somit die Auswertung.

### Typical composition in g/l

#### in g per 1l Medium

Yeast extract	10
Activated charcoal	2
ACES-Buffer	10
L-Cysteine	0.4
Iron (III)-pyrophosphate	0.25
α-Ketoglutarate	1
Potassium hydroxide	2.8
Agar	12
Bromothymd blue	0.01
Bromocresol purple	0.01
Glycine	3
Anisomycin	0.08
Vancomycin	0.001
Polimyxin B (in IE)	50000

\*Adjusted as required to meet performance standards

## Microbiological quality control

Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.

### Produktivität

Inkubationsbedingungen: 2 – 5 Tage bei  $36 \pm 2$  °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Legionella pneumophila	ATCC 33152 / WDCM 00107	>50%	Weiß-grau-blau-violett gefärbte Kolonien mit einem glatten Rand und einem charakteristischen milchglasähnlichen Aussehen

Inkubationsbedingungen: 5 – 10 Tage bei  $36 \pm 2$  °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Legionella anisa	ATCC 35292 / WDCM 00106 / DSM 17627	>50%	Weiß-grau-blau-violett gefärbte Kolonien mit einem glatten Rand und einem charakteristischen milchglasähnlichen Aussehen

### Selektivität

Inkubationsbedingungen: 3 Tage bei  $36 \pm 2$  °C; Beimpfungskonzentration:  $10^4$  -  $10^6$  KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Enterococcus faecalis	ATCC 19433 / WDCM 00009 / DSM 20478	teilweise Hemmung	-
Escheria coli faecalis	ATCC 25922/ WDCM 00013 / DSM 1103	vollständige Hemmung	-

### Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingungen: 48 ± 4h bei  $30 \pm 1$  °C

### Spezifikation

Ohne mikrobielle Kontamination